

“優良”優力黴素膠囊(賜福力欣)

ULEXIN CAPSULES (Cephalexin)

優力黴素(Cephalexin monohydrate)是一種口服半合成的廣效殺菌性頭芽孢菌素(Cephalosporin)抗生素，它的化學結構式是7-(D- α -amino- α -phenylacetamido)-3-methyl-3-cephem-4-carboxylic acid monohydrate.

藥 理：

優力黴素在酸中很安定，所以在飯前或飯後服藥都不影響藥效，而且口服後吸收很快，如果服用250 mg及500 mg的劑量，一小時後可以測得的平均最高血中濃度分別是9 mcg/mL及18 mcg/mL，服用六小時以後，仍舊可以測得顯著的血中濃度，服用後八小時，已經有90 %以上的優力黴素以原形式未受破壞由尿中排出。如果服用250 mg的劑量，在這八小時內的尿中最高濃度可達到1,000 mcg/mL。

成 分：Each capsule contains :

Cephalexin.....250 mg及500 mg (base activity).

適 應 症：

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

作 用：

優力黴素對下列有感受性的細菌所引起的呼吸道、生殖泌尿道、骨骼、皮膚及軟組織等的感染有治療的效果。

乙種溶血性鏈球菌(Beta-hemolytic Streptococci)。

葡萄球菌(Staphylococci)包括凝固酶陽性(Coagulase-Positive)，凝固酶陰性(Coagulase-Negative)以及產生青黴素酶(Penicillinase producing)之菌株。

肺炎雙球菌(Diplococcus pneumoniae)。

大腸桿菌(Escherichia coli)。

奇異變形桿菌(Proteus mirabilis)。

克雷白氏菌屬(Klebsiella sp.)。

流形性感冒嗜血桿菌(Hemophilus influenzae)。

卡他性奈瑟菌(Neisseria catarrhalis)。

劑 量：

成人—每日劑量是1至4 g，分次服用，普通感染，成人劑量為每六小時服用250 mg對嚴重的感染，則需較高劑量。

兒童—每日劑量為每公斤體重25~50 mg分四次服用，嚴重感染時劑量可加倍。

優力黴素 每日劑量

| | 一 般 感 染 | 嚴 重 感 染 |
|----------------|-----------------------|------------------------|
| 成人及兒童體重超過25公斤者 | 每六小時250 mg | 每六小時500 mg至1 g |
| 兒童體重在25公斤以下者 | 照體重每公斤每日25~50 mg分四次服用 | 照體重每公斤每日50~100 mg分四次服用 |

本藥須由醫師處方使用。

副 作 用：

胃腸道—曾有腹瀉、噁心、嘔吐、消化不良及腹痛的報告，但均不致於達到須要停藥的程度。過敏性—曾發生紅腫、蕁麻疹及血管性水腫的過敏症狀。但停藥後，症狀可自然消退。其他反應包括生殖器及肛門搔癢、生殖器念珠狀菌病(Genital moniliasis)，陰道炎及陰道異常分泌、眩暈、疲勞、及頭痛，也曾有嗜伊紅性白血球增多症(Eosinophilia)，嗜中性白血球減少症(Neutropenia)及SGOT和SGPT輕微增高的報告。

注 意 事 項：

- 對青黴素過敏的患者，使用頭芽孢菌素時應特別小心，因為青黴素族與頭芽孢菌素族可能具有部份交互過敏的性質(Cross-allergenicity)。
- 如對優力黴素發生過敏反應，應該停止用藥，並以一般藥物(如腎上腺素或其他加壓胺，抗組織胺，或腎上腺皮質類固醇)治療之。
- 治療期間，如果發生再感染(Superinfection)時，應該採取適當措施。
- 腎功能有顯著損傷的患者，其安全劑量可能比一般建議劑量低，所以使用本劑時，應該配合仔細的臨床觀察。
- 孕婦使用本劑的安全性尚未確定。
- 使用本劑後，如果採用Benedict氏液，Fehling氏液或Clinitest片法檢驗尿糖，可能獲得葡萄的假陽性反應。
- 接受Cephalosporin治療期間，可能使直接Coombs試驗得到陽性反應，母親在生產前若曾接受Cephalosporin的治療而初生嬰兒又有直接Coombs試驗的陽性反應，這反應被認為是由Cephalosporin所引起的。

包 裝：

優力黴素(ULEXIN CAPSULES)每膠囊含Cephalexin monohydrate相當於250 mg及500 mg之Cephalexin base。

50'S、100'S、500'S、1000'S塑膠瓶裝及4~1000'S PTP鋁箔盒裝。

“U-LIANG” C004 “優良”優力黴素膠囊250毫克 衛署藥製字第016706號
“U-LIANG” C008 “優良”優力黴素膠囊500毫克 衛署藥製字第022105號



優良化學製藥股份有限公司
桃園縣中壢市東園路十七號