

曼特松乳膏
Mentasone Cream
衛署藥製字第 048359 號
GMP G-9362

無香味

成 份：Each gram contains:

Mometasone Furoate.....1mg

作 用：Mometasone Furoate 為一種合成的類固醇，具有抗發炎、止癢及血管收縮等特性。

適應症：對類固醇具有感受性之皮膚病所引起之炎性反應及搔癢之緩解。

用法用量：一日一次，薄敷於患處。

本藥須由醫師處方使用。

副 作 用：極少發生的局部副作用包括：皮膚感覺異常、搔癢和皮膚萎縮症狀。

禁 忌 症：禁用於對 mometasone furoate 或其他類固醇，或製劑中任一成份過敏的病人。

注意事項：如有刺激、過敏發生，應停用本劑，並施予適當治療。如患處有感染發生，應開始用抗黴菌劑和抗生素，如果情況未見好轉，則應停用本劑，直至感染得到適當控制。全身性使用之類固醇易引起的副作用，如腎上腺抑制，偶爾也會發生在局部使用之類固醇，特別易發生於嬰幼兒。

若廣大的體表面積治療或密閉式技術使用局部類固醇會增加全身性的吸收，所以在這樣情況下長期使用本劑，尤其嬰幼兒，需特別小心。兒童使用局部類固醇較成人病患更易導致下視丘-腦下垂體軸功能抑制及 Cushing's syndrome，因為體表面積/體重的比例較大。兒童局部使用類固醇必須將劑量限制在可達有效治療的最低使用量，長期的類固醇治療可能會干擾兒童的生長發育。

本劑不可作為眼用。

懷孕或哺乳婦女：Mometasone furoate 對懷孕婦女的安全性尚未建立，因此只有在對母體的有益性大於對胎兒的危險性時才可使用局部類固醇。此等級的藥品不得大量或長期使用於懷孕婦女。局部使用類固醇，尚不知全身的吸收量是否會分泌在乳汁中到達可測得的量，但全身性給藥的類固醇會分泌於乳汁之中，然而其分泌量不足以影響幼兒。在用藥期間應先評估用藥對母親的重要性，再決定停止哺乳或停藥。

適量使用：症狀-過量長期使用會抑制下視丘-腦下垂體功能，引起腎上腺功能抑制。

治療方法-可給予適當的症狀療法。急性皮質類固醇過多為可逆反應。如有需要，可作適當處理來治療電解質不平衡。如果為慢性中毒，建議以漸進式中止類固醇治療。

包 裝：1000 公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝。

請保存於 25°C 以下，兒童接觸不到之處。

cGMP



人人化學製藥股份有限公司
中壢市南園二路三號