

"生達"保胃 懸乳液


Scrat Suspension "Standard"

衛署藥製字第 043945 號 G-7213 Code No.LS-05 2214180

"生達"保胃懸乳液所含的主成份 Sucralfate 就化學性質而言，是一種蔗糖八硫酸鹼性鋁鹽(Basic Aluminum Salt of Sucrose Octasulfate)。

「主成分」：每 ml 含
Sucralfate 100mg

構造式：Sucralfate為蔗糖八硫酸鹼性鋁鹽



作用機轉：



從實驗數據上得知，Sucralfate 之所以能治療潰瘍，是由於此劑具細胞保護的作用。當口服時，於胃內的強酸下，Sucralfate 會變為帶有多個陰離子且具高度黏著性的物質。而在潰瘍區域的黏膜由於細胞質滲出物及細胞碎片的堆積，造成有豐富蛋白質的區域。Sucralfate 的多個陰離子為負電，而集中於潰瘍區域的蛋白質為正電，故在 Sucralfate 與潰瘍區之間形成多價鍵結。此即為 Sucralfate 之所以有選擇性與潰瘍區域作用的機轉。除此之外，並可形成一層具黏著性的保護膜包於潰瘍傷口處，而具有三重功能可增強細胞保護障壁。

「作用特點」：

一、Sucralfate 於強酸下能高度選擇性地吸附在破損的胃腸黏膜上，形成一種具三重功能的潰瘍保護層。

1. 抗滲透性之保護層：阻止胃酸及胃蛋白酶滲入潰瘍

黏膜區之刺激作用。

2. 抗消化性之保護層：保護新黏膜細胞避免被胃蛋白酶分解。

3. 抗崩解性之保護層：抵抗膽汁、酒精、阿斯匹林或其他抗發炎藥劑之崩解新黏膜細胞。

二、Sucralfate 是一種非全身性的藥物，口服後幾乎有 95% 的藥物仍留於胃腸道，所以在胃腸道僅少量被吸收。

「適應症」：

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道潰瘍、逆流性食道炎。

「用法用量」：

每天四次，每次 10ml (或一包)，空腹時使用(飯前半小時服用)。本藥須由醫師處方使用。

使用時注意事項：

一、服用時儘可能在空腹時進行，大約於進餐前半小時服用。

二、本品之功能是在強酸下方能達到最佳療效，因此若欲與制酸劑或減少胃酸分泌之藥物(如： H_2 -組織胺接受器拮抗劑)併用，則二者服用的時間至少要隔開 30~60 分鐘之久。

「副作用」：

胃腸偶而出現便秘的現象(於 2599 例治療病患中，僅發現有 2.2% 之便秘)。

「包裝」：

4000 公撮以下塑膠瓶裝、鋁箔袋盒裝、膠箔袋盒裝。



GMP 藥廠 ISO9001

生達化學製藥股份有限公司二廠

臺灣省台南縣新營市開元路 154 號