

115-210mm



# 健康得眠膜衣錠 7.5公絲

## Genclone 7.5mg F.C.T.

G-6938  
衛署藥製字第 043460號

**成分：**每錠健康得眠膜衣錠含 Zopiclone 7.5 公絲。

**劑量：**成人每次服用一錠。老年人開始時每次半錠，若需要可增至一錠。  
肝功能不良者每次服用半錠；睡前服用。  
為達良好治療品質，請切實遵守醫師之建議。

**賦形劑：**Dicalcium Phosphate Dihydrate、Lactose Fast Flow、Corn Starch、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Sepifilm LP770。

**適應症：**失眠症。

**配伍禁忌：**① 已知對 Zopiclone 過敏者。  
② 代償作用失調之呼吸功能不全者。  
③ 15 歲以下的幼童。

**注意事項：**① 長期高劑量使用時，突然停藥會產生戒斷症狀，因此最好逐漸減量。  
② 未經醫師指示，不可長期使用。  
③ 本品屬新藥，雖然至今尚無致癌及胚胎毒性的報告，為安全起見，勿給與懷孕婦女。  
④ Zopiclone 滲入母乳的機會很小，但不建議給泌乳中的婦女使用。  
⑤ 若過量時會產生深沉或昏迷樣睡眠，必需給予整狀治療。  
⑥ 由於本藥可能增加肌肉疲勞，肌無力的患者須特別注意。  
⑦ 對呼吸功能不全者或嚴重肝功能不全者，必須調整劑量。  
⑧ 請勿與酒同時服用。  
⑨ 對操作機器或開車的人必須特別注意，因為可能會出現晝間嗜眠現象。  
⑩ 服用本品於夜晚勿驟然起床，以免未完全清醒而跌倒。

**藥品交互作用：**① 本品與神經肌肉抑制劑 (Curare-like compounds 或其他肌肉鬆馳劑) 有相乘作用。  
② 本品與中樞作用抑制劑 (特別是 Neuroleptics) 併用時會增加鎮靜作用。  
③ 當與 Benzodiazepines 共用時，一旦停藥會增加戒斷症狀的危險。

**警語：**服用本品可能出現夢遊行為，例如開車、打電話及準備與食用食物。

**本藥須由醫師處方使用**

包裝：2~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

健亞生物科技股份有限公司 製造  
新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號

IT026C2