

綜合感冒治療劑

必克風 膠囊

P. P. C. CAPSULES

衛署藥製字第 026289 號

- 【成 分】** 每膠囊含有：
- | | |
|----------------------------------|--------|
| Acetaminophen..... | 120mg |
| Ethoxybenzamide..... | 300mg |
| Dexchlorpheniramine Maleate..... | 1.17mg |
| Caffeine Anhydrous..... | 50mg |
- 【賦形劑】** Magesium Stearate、Microcrystalline Cellulose 101、Pregelatinized Starch
膠囊殼：Brilliant FCF、Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine、Titanium Dioxide
- 【適應症】** 緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛)。
- 【用法·用量】** 通常成人(15歲以上)每次1粒，8歲~14歲每次1/2粒，一日服用3次，於飯後30分鐘以內服用之。本藥須由醫師處方使用。
- 【副作用】** (1) Acetaminophen: 偶有過敏反應，在建議劑量下使用少有副作用發生，長期服用超大劑量會引起肝毒性，在兒童急性中毒劑量小於150mg/kg。
(2) Dexchlorpheniramine Maleate: 嗜睡、口乾、倦怠感、視覺模糊、錯亂、小便困難、心跳加速。
(3) Caffeine: 神經質、興奮、睡不著與心搏加快。
- 【注意事項】** (1) 須置於小孩接觸不到之處。
(2) 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
(3) 除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
(4) 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
(5) 除非藥師、藥劑生或醫師指示，服用本劑時不得併服其他藥品。
(6) 不得併服含酒精飲料。
(7) 苯酮尿症(Phenylketonuria)患者不得服用本劑。
- 【警 語】** (1) 服用後若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加快、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
(2) 除非藥師、藥劑生或醫師指示，12歲以下不得使用。
(3) 除非藥師、藥劑生或醫師指示，曾經因藥物引起過敏症狀者不得服用。
(4) 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
(5) 吸煙、慢性阻塞性肺炎，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本劑。
(6) 服用本劑後，駕車或操作危險器械時要小心。
(7) 除非藥師、藥劑生或醫師指示，青光眼、肺氣腫、呼吸急促或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用本劑。
(8) 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
(9) 不要服用本劑超過七天。
(10) 服用本劑後，如果症狀沒有改善或症狀還併隨有發燒或發燒持續三天，應停藥立即就醫。
(11) 服用本劑後，如果喉嚨疼痛持續二天以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
(12) 服用本劑時請勿再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張、興奮與失眠，且常會引起心搏過速。
- 【包 裝】** 6~1,000粒 鋁箔盒裝及塑膠瓶裝。



Code No.: C-03

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市241三重區三和路四段77、79號

訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405