

“景德” 氯絲菌素 眼藥水 0.25%

CHLORAMPHENICOL Ophthalmic Solution 0.25%
"Kingdom"

【成分名】

Chloramphenicol

【劑型、含量】

點眼液劑：每ml含Chloramphenicol (2.5 mg) (力價)

【適應症】

沙眼、葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌等引起之疾患。

【用法用量】

每間隔一~四小時點1滴。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. Chloramphenicol對新生兒可能導致腹部膨脹、發紺、血管萎縮等副作用，應避免使用。

2. Chloramphenicol可能導致顆粒性白血球缺乏病 (Agranulocytosis)、再生障礙性貧血 (Aplastic anemia)，服用大劑量會導致紅血球之發育不全，應經醫師處方使用，必要時應作白血球、紅血球及其分類計算，遇有計數變化時，應停止使用。

氯黴素眼藥水，雖然不會引起再生不良性貧血，但長時間使用，可能會有影響，因此有些藥學專家建議，使用其他抗生素，但也肯定氯黴素的治療價值，因為其脂溶性佳，而且具優越角膜穿透力。和其他使用在眼睛的抗生素例如Neomycin相比較下，氯黴素的毒性反應還是低很多。

未曾有任何醫學上證據顯示對孕婦、產婦及授乳婦有影響，但還是要小心給藥。

療程必須盡力完成，若忘記使用儘快補回，但卻不要提早使用在接近下一次給藥時間前。

投與本品數天後，若情況未見改善，請各訴你的醫生。

【副作用】

很長時間使用本品可能會有下列症狀產生，但機會非常少：皮膚蒼白、喉嚨發炎、發燒、不尋常出血、瘀血、疲倦或虛弱。

若有以上症狀產生時只要停止給藥即可恢復。

【賦形劑】

Sodium Borate、Boric Acid、Dist. Water。

【貯存】

緊密容器中，於4°C冷藏及避免光線直射和冷凍。

貯存在小孩拿不到的地方。

有效期間內使用，若已超過有效期間，請勿使用。

【包裝】

1000公撮以下瓶裝。

衛署藥製字第032282號

G-1652

景德製藥股份有限公司

廠址：桃園市蘆竹區長安路一段80號、148號2樓至7樓