

恆脈循持續性膜衣錠 30 毫克**Nifedipine S.R.F.C. Tablets 30 mg"CYH"**

網號：

【成分名】Nifedipine**【劑型、含量】**每錠含 Nifedipine 30mg**【臨床藥理】**

Nifedipine 是一種鈣離子阻斷劑(Calcium channel blockers)，能有效地抑制細胞外的鈣離子，經由特異的 Slow calcium channels 進入心肌和平滑肌的細胞裡，故能擴張冠狀動脈和小動脈，並能阻止冠狀動脈痙攣，顯著改善對心肌的氧氣供應，而且明顯減少心肌氧氣需要量，對於狹心症(心絞痛)及高血壓的治療有很好的效果。口服吸收良好，會先在肝臟代謝而失去部份活性(First-pass effect)，所以生體可用率較低。

| 吸收率 (%) | 絕對生體可用率 (%) | 開始作用(分鐘) | 作用時間(小時) | 蛋白質結合率 (%) | 半衰期(小時) |
|---------|-------------|----------|----------|------------|---------|
| 90 | 45-70/86 | 20 | 4-8/12 | 92-98 | 2-5 |

【適應症】

狹心症、高血壓。

【用法用量】本藥須由醫師處方使用。

劑量因人而異，過量會引起低血壓。

起始劑量：每次 10~20mg，一天三次。每日最高劑量 180mg。

緩釋劑：每次 30~60mg，一天一次。不可嚼碎，以 7~14 天的間隔慢慢增量。服用後糞便中可能出現成形但不含主成份的藥片。

【注意事項】

1.本藥有增強降血壓及 β-接受體阻斷劑(Beta-blocking agent)的作用。

2.使用鈣離子拮抗劑使症狀惡化者，應立刻停藥。

3.孕婦及可能懷孕之婦女禁用。

FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數)：C

4.腎機能障礙及肺高血壓患者應慎重投與。

5.10%使用 Nifedipine 的患者，會因動脈血管擴張而引起輕微到中度水腫，主要出現於下肢，可用利尿劑緩解。

6.使用 Nifedipine 偶而會使肝酶(如 Alkaline phosphatase、CPK、LDH、AST、ALT)顯著升高。

7.停用 β-阻斷劑後，心絞痛的發作頻率會增加。此時若開始使用 Nifedipine，反而使情況惡化。應在使用前逐漸減少 β-阻斷劑的劑量。

8.兒童安全性及有效性尚未確立。禁忌——孕婦、及對本藥過敏者。

9.少數病人在服用本藥後，會發生缺血性疼痛，應先停止使用，並請教醫師。

10.與 H₂接受器拮抗劑併用，曾報告發生 Nifedipine 之血中濃度增加，但直到目前，並未出現明顯臨床反應。雖然大多數的研究顯示，對於 Digoxin 血漿濃度無顯著臨床影響，但仍須記住可能有相互作用產生。

11.與 Quinidine 併用時，不論 Quinidine 之劑量高低，血漿中 Quinidine 量皆會受到抑制。

12.使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時，應注意可能產生的藥品相互作用。

【副作用】

1.本藥副作用很少出現，如果有的話，也只有發生在初期治療的時候，而且短暫、輕微，偶發症狀可能是頭痛、暖熱感、眩暈和嘔吐。

2.有嚴重腎功能障礙者，BUN 及 Creatinine 會上升。

3.過敏症:發疹、搔癢等現象。

4.動物試驗有催畸性報告。

5.Nifedipine 有較強的血管平滑肌作用，因血管擴張易發生頭痛、潮紅等副作用。

保存條件：請保存於室溫(30°C以下)及小孩接觸不到之處。

包裝：2~1000 錠鋁箔盒裝，塑膠瓶裝。

委託者：

 中化裕民健康事業股份有限公司
Chungwa Yuming Healthcare Co., Ltd.
台北市中正區襄陽路23號8樓

製造廠：

 中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口182-1號