

衛署藥製字第 025939 號

“美亞” **膿化清** 膠囊 200 毫克(乙醯半胱胺酸)

Acetin Capsules 200mg “Mayer” (Acetylcysteine)

本劑有液化粘液作用，能將粘性及膿性分泌物及痰分解。

【成分】

每膠囊含：

Acetylcysteine.....200mg

【適應症】

減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

【用法用量】

一天 3 次。成人每次 1 粒，12 歲以上適用成人劑量。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量。
5. 服藥後若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
6. 本藥不得與含酒精飲料併服。

【警語】

1. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾患(包括如慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起之咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。
2. 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - ① 3 歲以下，請洽醫師診治。
 - ② 曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。
4. 本劑因會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如遇自然咳出困難時，宜採用機械吸引、拍痰或變換姿勢等適當的處理步驟。
5. 除非有醫師藥師藥劑生指示，下列情況不建議自行使用：
 - ① (支氣管性)氣喘及伴有呼吸功能不全之病人。
 - ② 高齡者。
6. 本藥含 Acetylcysteine，使用後若有以下症狀發生，應立即停藥就醫：
 - ① 消化道：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。
 - ② 偶有發疹等過敏症狀。
 - ③ 其他：偶有血痰、惡寒、發熱、鼻漏、口內炎等症狀發生。

【包裝】

6~1000 粒塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

【儲存條件】

避光室溫儲存。



製造廠：台裕化學製藥廠股份有限公司

TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號

TEL：(03)5826655 FAX：(03)5822389

委託者：台灣美亞藥品股份有限公司

訂貨專線：(04)23265827~8 FAX：(04)23265829

地址：台中市西區精忠街 15 號