

"生達"益可寧(歐拉) 糖衣錠 10 公絲

Secorin (Oxazolam) S.C.Tablets 10mg "Standard"

衛署藥製字第 028649 號 G-0319 Code No.TS-15

「成分」:每錠含

Oxazolam 10mg

「臨床藥理」:

- 1.對於(mouse、hamster、rat、monkey)衝突反應、狂暴性、攻擊性、興奮等的實驗動物情緒障礙之抑制作用(靜隱作用、馴化作用)很明顯,另一方面,催眠、肌肉遲緩、步行失調等的自發性行動抑制作用較弱(mouse),條件迴避反應的抑制也較少(rat)
- 2.關於靜隱作用,從貓、兔子的實驗中,推定其係特異的作用在扁桃核下視丘之大腦邊緣系的結果。對於人體意識水準的變化,檢討顯示腦的興奮水準的光—眼輪肌肉反射的影響,並無抑制作用,對於腦幹網樣體—新皮質賦活性(意識水準)幾乎無影響。
- 3.對於經由 Megimide、Pentetrazol 引起陣發性痙攣(mouse、rat),振動誘發痙攣(Elmouse)有抑制效果。

「藥物動力學」:

依文獻資料:健康成人七例中,空腹時一次經口投與 20mg 後的血液中,均有變化物質,其主要代謝物是 N-desmethyldiazepam,尿中主要代謝物是 2-amino-5-chlor-4-hydroxybenzophenone(ACHB)和其共軛體及 2-amino-5-chlorobenzophenone(ACB)。

「適應症」:

焦慮狀態。

「用法用量」:

本藥須由醫師處方使用

1. 治療時,通常成人每次 10~20mg,每天 3 次。
2. 麻醉前投藥時,通常手術前每 kg 體重以 1~2mg 口服。
3. 視年齡症狀,可適宜增減。

「注意事項」:

一般注意:

a. 因為會引起嗜睡、注意力、集中力、反射運動能力

降低,故儘量不要從事開車等伴有危險性的機械操作。

b. 使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時,應注意可能產生的藥品相互作用。

「禁忌」:

a. 急性狹角性青光眼(急性狹隅角綠內障)之患者。重症肌無力症之患者。

「慎重服用」:心臟病、肝病、腎病之患者、腦部功能障礙者、嬰兒、小孩、衰弱病患、中等度或嚴重的呼吸不全患者、高齡者(請參照高齡者的投與)。

「對孕婦的投與」:

a. 據免疫學之調查報告,懷孕中病患,投與其他的 Benzodiazepine 系化合物時,和對照群比較之下產生畸形兒等之殘障兒比例非常的多,故孕婦(3 個月以內)只能在被判斷治療上有益,且在挽救危機時服用。

b. 據報告,服用 Benzodiazepine 系化合物(Diazepam、Nitrazepam)會使新生兒發生哺乳困難、肌張力降低、嗜眠、黃疸的增強等症狀。故懷孕後期的婦女只能在被判斷治療上有益,且在挽救危機時服用。

c. 因有其他 Benzodiazepine 系化合物(Diazepam),移行至母乳中引起新生兒嗜眠,體重減輕等之報告,而也會有黃疸增強的可能性,所以授乳婦要避免服用。

d. 因有其他 Benzodiazepine 系化合物(Diazepam),在分娩前連續服用時,出生後的新生兒有出現禁斷症狀(神經過敏、震顫、過度緊張等之報告)。

「對高齡者的投與」:

因對高齡者的投與,很容易出現運動失調等副作用,故開始時應從少量慎重服藥。

「相互作用」:

和下列藥品併用(Phenothiazine 類衍生物、

Barbiturate 類衍生物等中樞神經抑制劑、MAO Inhibitors)或是酒精類會增強其作用。

「副作用」:

1. 依賴性：Benzodiazepine 系化合物大量連續服用時，偶而會引起藥物依賴，因有此報告，故對本藥的投與需詳細的慎重觀察，不可過量，長期服用如需停藥時，則需注意要慢慢的進行減量。
- 2.精神、神經系統：有時會有睡意、蹣跚、頭昏、頭痛、失眠、舌頭不靈活，偶而也會有焦急不安定的現象出現。
- 3.循環系統：麻醉前投藥偶而會有頻脈現象。
- 4.消化系統：有噁心、便秘、食慾不振、胃部不舒服、下痢、口渴之現象、偶而也會有嘔吐之現象。
- 5.過敏症：如有發疹、蕁麻疹等過敏症狀出現時請停止服藥。
- 6.骨骼肌：有時會有倦怠感等肌張力降低症狀。

「包裝」:

1000 錠以下盒、瓶裝。



GMP 藥廠 ISO9001
生達化學製藥股份有限公司二廠
臺灣省台南縣新營市開元路 154 號