

消炎、解熱、鎮痛劑
艾斯美特 膠囊 60 毫克

ACEMET Capsules 60MG

[說明]

本品係一新合成之非類固醇抗發炎藥，具有強力、迅速的消炎、解熱、鎮痛作用、且耐受性極佳，治療範圍廣，副作用低，很適合用來長期治療風濕症、關節炎。

[成分] 每粒膠囊中含有

Acemetacin 60 mg.

[作用]

Acemetacin 為一種非類固醇抗發炎劑。其可有效地阻斷發炎介質與內生性熱原—前列腺素的生成，進而達到消炎、解熱、鎮痛的作用。臨床報告顯示本品不僅在治療各種風濕症的效果佳；同時，病人的耐受性好、副作用低，非常適合用來長期治療各種風濕症、關節炎。

[適應症]

風濕性關節炎、退化性關節炎(骨關節炎)、僵直性脊椎炎、痛風、肌肉炎、腱鞘炎、滑囊炎。

[用法·用量]

除非醫師特別指示，通常成人劑量是每天 1-3 次，每次 1-2 粒，在飯後直接以開水口服（不可咬碎）。並依病情的輕重及種類而調整劑量和服用時間。

唯有在急性痛風時或醫師指示下方可使用大劑量。

本藥須由醫師處方使用。

[注意事項]

1. 曾對 Acetylsalicylic Acid 或 Indomethacin 製劑過敏者不要使用。
2. 有胃潰瘍或十二指腸潰瘍病史之患者不要使用。假如一定要使用，請在醫師嚴格監督下方可使用。
3. 有嚴重肝、腎障礙患者需要小心使用。由於到目前為止，對小孩、孕婦使用本劑治療尚未獲得充分的經驗，所以 14 歲以下的小孩、孕婦（特別是懷孕前 3 個月）應避免使用，除非絕對需要。

[副作用]

罕有頭痛、眩暈或胃腸道障礙，偶有視覺模糊、聽覺障礙、倦怠感和皮膚過敏。通常這些症狀並不十分顯著，而且在治療期間會消失，假如這些症狀持續下去的話，請諮詢醫師指示。使用本劑於感染性疾病時，應小心謹慎，因為本劑有時候會遮蔽感染症狀。

[警告]

1. 如果出現眩暈，請勿駕駛車輛或操作危險器械，酒精會加強眩暈作用。
2. 藥物交互作用：雖然到目前為止所做的研究顯示，本劑與抗凝血劑或口服降血糖藥之間沒有任何交互作用。但我們建議，如果您同時使用這些藥物，請小心、謹慎，最好在醫師的指示下使用。

[貯存條件]

請置於 30°C 以下貯存。

[賦形劑]

Spray Dried Lactose、Aerosil 200、Talc、Magnesium Stearate、Capsule(Gelatin、Titanium Dioxide、New Coccine、Sunset Yellow FCF、Sodium Lauryl Sulfate、Glycerine)

[包裝]

4~1000 粒，塑膠瓶裝；鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 G-5349
040011 號

健喬信元醫藥生技股份有限公司

藥商地址：303 新竹縣湖口鄉光復北路 21 巷 4 號
製造廠名：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠
製造廠址：303 新竹縣湖口鄉工業一路 6 號

SLT9290C