

“優生” 旺血 糖衣錠

Wanse S.C. Tablets "Yu Sheng"

衛署藥製字第002846號
LT-026-WS

【主要成分】每錠含：

Ferrous Fumarate.....	100mg
Cyanocobalamin.....	4mcg
Folic Acid.....	2mg

【適應症】

一般貧血。

【用法用量】

成人1次1~2錠，小兒1次1錠，1日3次，飯後即時服用。
本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】

1. 對於本藥任一成份過敏者禁用。
2. 患有血色素沉着病(hemochromatosis)或含鐵血黃素沉着症(hemosiderosis)之患者禁用含鐵之製劑。

【副作用】

1. 含鐵製劑的副作用包括便秘、腹瀉、嘔吐、噁心、深色糞便、腹痛、不過通常為暫時的。
2. 曾有服用葉酸後導致過敏的情形發生。

【注意事項】

1. 意外服用過量之含鐵製劑。為6歲以下孩童中毒致死的主因，故本藥須放置於小孩不及處。意外服用過量時，須立即電詢醫師或毒物防治中心。
2. 除非經醫師指示。否則服用量不應超過推薦之劑量。
3. 服用含鐵製劑，糞便顏色會變黑或變深色。
4. 不宜單用葉酸，治療維他命B12缺乏之惡性貧血或巨紅血球性貧血。
5. 每日服用超過0.1mg之葉酸，可能會遮蓋惡性貧血之症狀，因雖血液的症狀較緩解，但神經方面之症候仍舊進行。

【包裝】

6~1000錠 / 塑膠瓶、鋁箔盒裝。

【賦形劑】

Sodium Starch Glycolate, Lactose, Povidone K-30(Polyvinyl Pyrrolidone K30), Magnesium Stearate, Hydroxypropyl cellulose L, Sucrose, Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate, Gelatin, New Coccin(Food Red No.6), Hypromellose 615, Castor Oil(Oleum Ricin)(Ricinus Oil)



優生製藥廠股份有限公司
台中市南屯區工業區21路14號

MM 201511