

腎福諾輸注射液

Nephrosteril Infusion Solution

衛署藥輸字第 017819 號

本藥限由醫師使用

Nephrosteril 是 7% 之左旋胺基酸溶液，其中必需胺基酸佔 60%，非必需胺基酸佔 40%。

[成份] 每公升含

L-Isoleucine	5.10 g
L-Leucine	10.30 g
L-Lycine monoacetate = L-Lycine 7.1 g	10.01 g
L- Methionine	2.8 g
Acetylcysteine = L-Cysteine 0.37 g	0.5 g
L-Phenylalanine	3.8 g
L-Threonine	4.8 g
L-Tryptophan	1.9 g
L-Valine	6.2 g
Arginine	4.9 g
L-Histidine	4.3 g
Aminoacetic acid	3.2 g
L-Alanine	6.3 g
L-Proline	4.3 g
L-Serine	4.5 g
L-Malic acid	1.5 g
Glacial acetic acid	1.38 g
胺基酸含量	70 g/l
氮含量	10.8 g/l
總熱量	280 kcal/l
理論滲透壓	645 mosm/l

賦形劑：Water for injections

[適應症] 不能攝取適當食物之患者之補助治療劑，蛋白質之消化吸收機能或合成利用障礙，嚴重創傷、火傷、骨折時蛋白質之補給，蛋白質攝取減少之營養失調症。

[劑量] - 對於一般急慢性腎功能不全而未進行血液透析患者，最高劑量每天每公斤體重 0.5 公克胺基酸，以 70 公斤體重計算，約等於每天 500 毫升。

- 對於進行血液透析和血液過濾的急慢性腎功能不全患者，最高劑量每天每公斤體重 1 公克胺基酸，以 70 公斤體重計算，約等於每天 1000 毫升。

- 最大劑量：最大劑量每天每公斤體重 1.5 公克胺基酸，以 70 公斤體重計算，約等於每天 1500 毫升，熱量必須預先或同時以口服或非口服方式供給。

[使用期間] - 急性腎功能不全患者連續使用若干天至最多二週。

- 沒有進行血液透析、血液過濾或腹膜透析治療的慢性腎功能不全患者，可連續使用直到可以口服蛋白質為止。

[禁忌症] 胺基酸代謝紊亂、嚴重肝功能下降、心臟功能不全、水腫、低血鉀、低血鈉。

[副作用] 輸注速度過快可能會造成噁心、寒顫和嘔吐。

[注意事項] - 本溶液不含電解質，須注意血中電解質濃度。必要時加足夠的鉀以確保胺基酸的合成或利用。

- 須定時檢查水和電解質代謝、酸鹼平衡及血清尿素。

- 如引起腎功能低下，則須先補充足量水分和電解質。

- 本溶液可能引起胃酸分泌及加重潰瘍。

[配伍禁忌] 胺基酸溶液應避免加入可引起物理和化學性質改變的藥物，如不得不加入其他藥物時，應注意滅菌、完成混合或混合液之變化等。加入其他藥物之混合液不得存放。

[儲存條件] 必須在攝氏 25 度以下避光貯藏。超過有效期限不得使用。玻璃容器損傷或溶液呈現混濁外觀亦不得使用。

[包裝] 250、500 毫升玻璃瓶裝，每 10 瓶一箱。



製造廠：Fresenius Kabi Austria GmbH

廠址：Hafnerstraße 36, A-8055 Graz, Austria

次級包裝廠：Fresenius Kabi Austria GmbH

廠址：Am Gewerbepark 6, 8402 Werndorf, Austria.

藥商：台灣費森尤斯卡比股份有限公司

廠址：台北市 10653 仁愛路三段 32 號 5 樓