

廣效性抗生素製劑

紐奧黴素膠囊

250 公絲

NEOMYCIN Capsules

250 mg.

【作用・特點】

- 具廣範圍抗菌作用：
對革蘭氏陰性菌之赤痢菌屬、大腸菌屬、沙門氏桿菌屬、綠膿菌、變形菌等均有優異之抗菌作用。
對革蘭氏陽性之葡萄球菌（包括對其他抗生素耐性菌）白喉菌及其它結核菌、阿米巴痢疾菌等，低於濃度時，其阻菌力亦十分卓越。
- 具酸、鹼中安定之特性：
於酸、鹼中活性不變，亦不被破壞，在血清、膿汁及消化管分泌液內亦然。
- 口服用，自消化道吸收只約3%，其餘移行腸中，產生腸中高濃度，而發揮其特有之殺菌力，極適於腸管感染症之治療及腸管手術前處理。
- 口服後，97%左右均自糞便中排泄，故毫不蓄積，幾無毒性。
- 最低阻菌濃度為0.5~8mg/ml。

【主成分】

Each cap. contains:

Neomycin Sulfate.....250mg (Potency)

【賦形劑】

Magnesium Stearate、Talc

膠囊殼Cap (Gelatin、New Coccin、Titanium Dioxide、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine、Brilliant Blue FCF、Purified Water)

膠囊殼Body (Gelatin、Titanium Dioxide、Sodium Lauryl Sulfate、Sunset Yellow FCF、Tartrazine、New Coccin、Purified Water)

【適應症】

手術前或肝昏迷之病人用於腸道局部殺菌。

【用法・用量】

- ① 腸管感染症：成人一日八粒，分四回服用。
- ② 腸管手術前處理時，成人一日16粒，每日分四回服用，連續服用1~3日。

【注意】

1. 本藥須由醫師處方使用。
2. 服藥期間，宜對腎機能及聽力做週期性測定，必要時可中止用藥。
3. 對腸管潰瘍患者，宜審慎使用。
4. 偶有食慾不振、噁心、下痢等胃腸症狀。
5. 有過敏症狀發生時宜中止用藥；對 Streptomycin, Colistin, Gentamicin, Dihydrostreptomycin, Viomycin 等 Amino 糖系抗生素物質，有過敏性患者，禁用。
6. 防手術時感染之患者，於服藥後，麻醉劑、筋弛緩劑會增強其呼吸抑制作用，宜注意。

【儲存條件】

本品容易吸濕潮解，開封後請存放於25°C以下，避光密封保存。

【包裝】

100's 250's 500's (塑膠瓶裝)

衛署藥製字第011518號



順華藥品工業股份有限公司

新北市三峽區二鬮路186號

DSC-02
NEC-003