

拍得藍注射液
PATENT BLUE V

衛署藥輸字第 10682 號

化學式：C₂₇H₃₁N₂O₇S₂Na

物理化學特性：

Patent Blue V 是一種濃度為 2.5% 的水性溶液，其成分為：每 2 公撮／安瓿。

主成分：

Patent Blue V (鈉鹽)	0.05 克
賦形劑	
Sodium chloride	0.012 克
Disodium phosphate, dodecahydrate	0.001 克
Water for injection 加至	2ml

色度 No. 42 051. C. E. E. No E 131。

適應症：淋巴管部位的測定，動脈區域之測定。

用法·用量：

本藥限由醫師使用。

淋巴管：約注射 1 ml 之 Patent Blue V 於皮下組組。

·腳部自大腳趾。

·上肢自掌間，拇指基部（魚際）或小魚際突起之水平，或是自肘部。

動脈區域：動脈注射 Patent Blue V 能將有血管的組織染色，因而能用以決定抗核分裂療法之區域，為控制動脈內 Chimiotherapy 預定導管之正確位置。

一次灌注包含：

·80ml 等張鈉水溶液。

·40ml 2.5% Patent Blue V 溶液。

·20ml 1% Xylocaine 溶液。

之溶液 50ml。

包裝：

2 公撮安瓿裝 / 5 安瓿盒裝

注意事項：注射前需了解病患過去有無過敏或不耐反應記錄，有人建議給予此種病患 Corticosteroids（腎上腺皮質素）與 Antihistamines（抗組織胺劑）之前驅投藥，（即在用藥前對病患給予 Corticosteroids 和 Antihistamines 等藥物）然而最好的辦法是確定意外狀況時能做充分的緊急措施；腎上腺皮質，抗組織胺劑、葡萄糖水溶液、氧氣和插管儀器。

副作用：

Patent Blue V 可能產生過敏的副作用。過敏徵狀，若非特殊情狀，應該是會恢復，因其臨床現象經常是相當顯著的。此類反應在注射後很快就會發生。

最常見的是所謂的發紅反應，跟著局部出現蕁麻疹和偶爾會發生的嘴唇和眼皮浮腫，特別是浮腫部位會帶淡綠或藍色，那是由於染色素部分停留的緣故。低血壓、噁心、喉頭浮腫，甚至心血管衰竭時此反應會更嚴重。

製造廠：Guerbet

廠址：16-24, rue Jean Chaptal-93600 Aulnay-sous-Bois, France

藥商：台灣古爾貝特股份有限公司

地址：台北市 104 八德路二段 182 號

電話：02-8773-0899