

“衛達”

衛康恩 乳膏

外用

Weicort-N Cream "Weidar"

GMP G-1938

CODE No. WE-0710



[成分] : Each Gm contains:

Triamcinolone Acetonide 1.0mg

Neomycin(as Sulfate) 3.5mg(potency)

賦形劑 : Glyceryl monostearate, Propylparaben, Perfume,
Water purified, Isopropyl myristate, Propylene
glycol, Stearic acid, Cetyl alcohol, Spermaceti,
Wax emulsifying, Polyoxyethylene cetyler

[作用] :

1. Triamcinolone Acetonide 為 Corticosteroids，具有消炎、止癢以及收縮血管的作用。
2. Neomycin Sulfate 是革蘭氏陽性及陰性菌殺菌劑。

[適應症] :

革蘭氏陽性菌、陰性菌所引起的皮膚疾患。

[用法用量] :

每天 3~4 次塗薄層於患處。反應良好可減少使用次數至慢慢停用。

本藥須由醫師處方使用。

[注意] :

1. 禁用於對本劑過敏的患者。
2. 如有過敏或化學上刺激的現象時，應停止使用，並給予適當的處理。
3. 孕婦使用應先確定有使用之必要性，不過應避免大量使用及延長使用時間。
4. 授乳婦女使用時應小心。
5. 兒童使用時，對於 Corticosteroids 所引起的 HPA 軸抑制現象(Hypothalamic-pituitary-adrenal axis suppression)較敏感，較易引起 Cushing's syndrome，應特別注意。
6. 本劑限於外用，而且避免使用於眼睛。

[副作用] :

發生的頻率由大而下依序是：灼熱感、搔癢、刺激感、乾燥（患處）毛囊炎、多毛症、青春痘、色素不足、周圍皮膚炎、接觸性過敏、皮膚炎、二度感染、皮膚萎縮、汗疹等。

[過量] :

局部用 Corticosteroids 吸收過量會造成全身性反應(HPA)軸抑制此時應停用，降低使用次數，及以較低效力的 Corticosteroids 取代。

[儲藏] :

貯存於密閉之容器內並存放於 25°C 陰涼處。

[包裝] :

100 公克以下鋁軟管裝、塑膠罐裝；450 公克塑膠罐裝。