

“安星”


衛署藥製字第 04462 號

治 加 鬆 錠

DEXAMETHASONE Tablets “Astar”

副腎皮質荷爾蒙自從被發現以來，已普遍為醫療界所樂予採用，為劃時代之一大貢獻。本劑〈Dexamethasone〉即是各種副腎皮質荷爾蒙中最為進步之一種新誘導體其藥效比 Prednisolone 強 5~10 倍，故使用少量即可見效。並有強力之 Glucocorticoid 作用，而對於副作用所謂 miner alcorticoid 甚微，實為一種效力強而副作用微之優良製劑也。本劑係 Prednisolone 之分子導入氟素原子與甲基〈Methyl 基〉之誘導體，該化學構造式如下：

(16 $\alpha$  — methyl — 9 $\alpha$  — fluoro — Prednisolone)



〔組成〕每錠中含有：

Dexamethasone ..... 0.5mg

〔賦形劑〕

Lactose、Potato Starch、Tartrazine、Magnesium Stearate。

〔特點〕

1. 作用力強：

本劑為最新之合成副腎皮質荷爾蒙，在臨床上抗炎症性效果比較 Cortisone 約 35 倍，Hydrocortisone 之 30 倍，Prednisolone 之 5~10 倍強，故投與少量即可發揮強力之抗炎症性作用，及抗風濕作用，抗過敏性〈Allergic〉作用。

2. 副作用微：

對於電解質代謝障害即水份、鹽分之貯留及鉀排出以及糖質代謝等作用較甚輕微。

〔適應症〕

風濕性關節炎、風濕熱、過敏性疾病、結合織炎及關節炎樣疾病、重症皮膚疾病、炎症性肉芽腫。

〔用法用量〕

1. 慢性病症〈非致命的症狀〉普通用量為一日 1.5mg~3mg 〈3~6 錠〉，分為 3—4 次服用。

2. 急性病症普通用量為一日 2—4mg 〈4—8 錠〉分為 3—4 次服用。

3. 視症狀緩和後每隔 3—4 日遞減 0.25mg 〈 $\frac{1}{2}$  錠〉，普通維持量為每日 0.5—0.75mg 〈1~1 $\frac{1}{2}$  錠〉。

4. 停止投藥時須徐徐減量至停藥為止。

5. 視病症之種類，病況之輕重，個人差異或者合併其他療法等，用量用法須檢討使用為宜。

本藥須由醫師處方使用。

〔注意事項〕

本劑中含有 Dexamethasone 服用時請注意下列事項。

1. 急慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。

2. 對消化管障害如胃腸潰瘍務請特別注意。

3. 因主要副作用引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。

4. 糖尿病患者使用時有增加 Insulin 藥量的必要者請注意。

5. 對於有精神病因素者多加注意。

6. 服用本劑期間請充分補充蛋白質。

〔包裝〕2~1000 錠塑膠瓶裝。

安星製藥股份有限公司  
新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口 673 號