

國軍高雄總醫院藥劑科民眾用藥指導單











藥品名稱：Relenza Rotadisks 瑞樂沙旋達碟

藥品成分：Zanamivir

●**適應症：**治療成人及青少年(≥5歲)之A型及B型流型性感冒，
但使用抗病毒藥劑前仍應由醫師評估

【使用方法】

藥品安裝		吸入藥品	
	1. 移除藍色外蓋		5. 將白色滑盤推回裝置主體內部。(推到底聽到喀一聲)
	2. 抓住滑盤向外拉出，直到停下為止。		A. 將吸入器固定於水平狀態 (1) 盡量掀開上蓋。上蓋必須完全垂直，以確保能徹底刺破泡殼。 (2) 將上蓋推回原位。現在您的藥品圓盤已備妥可供使用。
	3. 輕壓白色滑盤兩側的指握部分。將滑盤從裝置主體取出。		B. 先盡可能的吐氣(請不要對著吸入器吹氣)，從吸嘴快速地深吸一口氣；然後憋住這口氣約 5-10 秒鐘。
	4. 將一組新的藥品圓盤放上轉盤。(藥品鋁箔突面對齊圓盤四個圓孔朝下放置)		C. (1) 盡量向外拉出白色滑盤(請勿將其完全取出) (2) 然後將它推回原位。(推到底聽到喀一聲) <u>重複步驟 A. 與步驟 B. 以吸入藥物。</u>
		第二吸	

●注意事項:

1. 請等到準備吸入藥物前再刺破泡殼。
2. 使用後請以紙巾擦拭吸嘴，並在未使用時將藍色外蓋裝回原位。
3. 其他吸入用藥和瑞樂沙同時使用的患者(例如速效性支氣管擴張劑)，建議先使用其它吸入用藥，呼吸調整順暢後再使用瑞樂沙。
4. 懷孕期間不可使用，尤其是在第一孕期(妊娠的最初三個月)；非對授乳母親之潛在效益超越嬰兒可能面臨之任何風險，才考慮對授乳母親使用。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向
醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
國軍高雄總醫院 藥劑科 藥物諮詢專線：07-7496730