

管2



“管制藥品局”

吩坦尼穿皮貼片劑 25 微公克/小時
Fentanyl Transdermal Patch 25ug/h “NBCD”
每片含吩坦尼 2.5 毫克

麻

25 $\mu\text{g/h}$

使用須知

許可證字號：衛署藥製字第 050018 號

注意：調劑本藥應依管制藥品專用處方箋為之。

本藥適用藥害救濟制度。

本藥須由醫師處方使用。

本貼片不可切割。

請詳閱說明書後使用。

藥商名稱：行政院衛生署管制藥品管理局製藥工廠

藥商地址：台北縣三峽鎮大同路 287 號

製造廠名稱：德山製藥股份有限公司

製造廠地址：嘉義縣民雄鄉民雄工業區中山路 38 號



4 712089 855018

25 $\mu\text{g/h}$

【使用前準備】

- ▶ 於上軀幹或上臂找一塊無刺激及無放射線照射的平整皮膚表面。對年紀較小的兒童而言，上背部為較理想的部位，因兒童移除貼片的可能性最低。
- ▶ 使用貼片前，要將貼藥部位(最好是無毛髮生長的區域)的毛髮剪除(勿用刮除方式剃除)。
- ▶ 如於使用貼片前，欲清潔吩坦尼穿皮貼片劑投與部位的皮膚，用清水潔淨即可。不能使用肥皂、油、乳液或任一其它會刺激皮膚或改變膚質的物質。
- ▶ 貼上貼片之前，應使皮膚完全乾燥。

【使用方法】

- ▶ 從密封包裝內取出吩坦尼穿皮貼片劑。(取出後應立即使用)



- ▶ 先將貼片保護層移除。



- ▶ 再將貼片貼上皮膚，並用手掌用力緊壓 30 秒，確保整片貼片完全與皮膚接觸，尤其要注意角落部位應緊密黏貼，避免碰到貼片的黏著層。



- ▶ 貼上後，以清水洗手。

【使用後處置】

- ▶ 使用過的吩坦尼穿皮貼片劑，應對黏後放入原包裝袋，繳回(醫院)藥局銷毀。
- ▶ 如有未曾使用剩下之貼片應退還(醫院)藥局。
- ▶ 貼上貼片後或移除貼片後只能用水洗手。

【警語及注意事項】

- ▶ **fentanyl 穿皮貼片劑**無論使用前後，均應放置於兒童無法觸及處。
- ▶ **fentanyl 穿皮貼片劑不能分割、切開或以任何方式破壞**，因為這可能會破壞 fentanyl 的緩釋劑型。
- ▶ 吩坦尼穿皮貼片劑可連續貼足 72 小時。新的貼片要貼在與前一片不同的位置。同一部位的皮膚必須相隔數日才可再貼上一片新貼片。

