

國軍高雄總醫院藥劑科民眾用藥指導單



藥品名稱：Depakine Solution 200mg/mL, 40mL/bot 帝拔癲口服液

藥品成分：Valproate sodium

- 本藥品可做為癲癇治療劑或情緒穩定劑。

● 如何服用？

每次服用 _____ CC, 量筒抽取至 _____ mg



玻璃藥瓶 量筒

一天服用 _____ 次

(早餐 午餐 晚餐 睡前, 用水稀釋後隨餐服用)

● 詳細說明：

藥盒內含一**玻璃溶液藥瓶**與一專用抽取**量筒**，量筒標示為毫克數(mg)。使用前須將藥袋上所處方的毫升(mL)數「**乘上 200**」以轉換為毫克數。mL 換算 mg 請參考以下表格。

毫升(mL)數	毫克(mg)數
0.25	50
0.5	100
0.75	150
1	200
1.25	250
1.5	300
1.75	350
2	400



舉例：藥袋處方為每次 1.5mL，量筒抽取量換算為 $1.5\text{mL} \times 200 = 300\text{mg}$



吸取至此劑量線
300 mg，即為 1.5 mL

SATW.VPA.17.10.0296 (10/17)

● 服用本藥時，應注意甚麼？

1. 孕婦不可使用，若有計畫懷孕或有疑似懷孕，請立即與醫師連絡勿自行停藥。
2. 本藥可能導致嗜睡及注意力不集中，應避免從事開車或操作機械等需要警覺力的工作。
3. 勿飲酒，以免加重嗜睡反應。
4. 在使用任何其他藥物（包括非處方藥，維生素和草藥產品）之前，請先諮詢您的醫生或藥師。
5. 若出現下列過敏反應，請立即回診或致電詢問：瘙癢或蕁麻疹、臉或手腫脹、嘴或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難、混亂，記憶障礙、尿液深或大便蒼白，食慾不振、胃痛、皮膚或眼睛發黃、發燒、皮疹、頸部、腋窩或腹股溝腫脹、突然和嚴重的胃痛、噁心、嘔吐、皮膚上的小紅點，尤其是小腿、異常出血、瘀傷或虛弱。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向

醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務

國軍高雄總醫院 藥劑科 藥物諮詢專線：07-7496751 轉 726291~5