

# Tamiflu 用法及注意事項

## 用法用量

- 一般服用 75mg , bid, 5Days
- 8歲以下小孩、腎功能不良者須調整劑量，計量調整如下：

### ➤ 8歲以下小孩劑量調整：

1歲以下嬰幼兒之治療建議劑量：

<3個月 :12mg bid

3-5個月 :20mg bid

6-11個月:25mg bid

1歲-8歲：

≤15 kg :30mg bid

>15-23 kg :45mg bid

>23-40 kg :60mg bid

>40kg kg :75mg bid

兒童的體重超過40公斤或8歲以上，且能夠吞服膠囊，則可以服用75公絲膠囊。

### ➤ 腎功能障礙病患：

creatinine clearance >30ml/min : 75mg bid

creatinine clearance 10-30ml/min : 75mg QD

creatinine clearance ≤10ml/min : 未有可供參考的建議劑量

- 肝功能障礙病患--沒有調整劑量的必要:75mg, bid, 5Days
- 老年者-----沒有調整劑量的必要:75mg, bid, 5Days
- 孕婦、授乳婦女--尚未有足夠的資料可供評估

尚未有足夠的資料可供評估孕婦在服用oseltamivir phosphate藥物時，是否可能造成畸胎或胎中毒的可能性。因此，唯有在確認使用Tamiflu® 的潛在益處大於可能對胎兒的危險時，才得以在懷孕期間服用此藥物。也唯有在確認Tamiflu® 對授乳母親的益處大於可能對哺育中嬰兒的危險之後，才能讓授乳母親服用此藥物。

## 副作用

- 一般：

噁心和嘔吐，通常是暫時性的且發生在第一次給藥的時候，曾有少數發生過敏反應的病例報告

- 特殊：

肝炎及肝指數上升，若有自我傷害及譫妄等神經傷害情況，須回診。

## 禁忌

Tamiflu 內含 sorbitol 遺傳性果糖不耐症的患者不適合使用

參考資料: 1. Tamiflu 仿單

2. 台灣兒科醫學會 <http://www.pediatr.org.tw/>