

國軍高雄總醫院藥劑科民眾用藥指導單

藥品名稱：ANTIGLUKO TABLET 850MG◇(降糖錠)、HENFORMIN F.C. TABLET 850MG◇(漢伏糖膜衣錠)、C.T.L. XR TABLET 500MG◇(驅糖樂持續錠)、METFORMIN. E. R TABLET 500MG◇(新福胰持續性釋放錠)、GLUBIN TABLET 500MG◇(利糖平錠)、GLUCOFIT ER TABLET 850MG◇(固糖平膜衣錠)、GLYFORMIN 850 TAB◇(吉立糖錠)、Janumet TABLET 50/500MG◇(佳糖維膜衣錠)

藥品成分：Metformin



● 有什麼藥效？為什麼要服用？

此藥是用來控制第二型糖尿病，使您的血糖在正常(接近正常)的範圍內。

● 如何服用？

1. 糖尿病無法根治，但高血糖會引起腎臟，眼睛及心血管病變；故需要長期良好的控制，請按照醫師指示服藥，不可因為沒有不舒服的自覺症狀而自行停藥。
2. 將此藥與食物併服，可減少腸胃不適。

● 服用此藥時，應注意甚麼？

1. 若您計畫(已)懷孕、哺乳或有肝腎方面疾病，請告知您的醫(藥)師。
2. 輕微感冒或發燒時，仍應正常服用本藥，並且每日監測血糖 3-4 次。若出現呼吸困難，嚴重咳嗽或高燒則應停用本藥並就醫。
3. 服用此藥時，若喝酒容易造成嚴重的低血糖，應避免喝酒。
4. 若您要接受某些需要使用顯影劑的檢查，如電腦斷層掃描，在檢查後應停止服用本藥 48 小時。
5. 因病住院時應告知醫師您服用本藥，以利醫師考慮是否需改用胰島素。
6. 若有以下高血糖症狀：頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、身體虛弱、呼吸困難、心跳加快、皮膚乾燥、反應遲鈍，請立刻聯絡您的醫師。
7. 若有以下低血糖症狀：不尋常的飢餓感、無力感、顫抖、心跳加快、冒冷汗、視力模糊、精神意志不易集中，應立刻補充果汁 200cc 或糖果 2-4 顆。高低血糖症狀有時不易分辨，可先測血糖再決定是否需要補充果汁或糖果。若常有高低血糖發生，請告知你的醫師或衛教師。

● 若忘了服藥，該怎麼辦？

盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥請盡快服用；若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

● 有副作用嗎？該如何處理？

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：胃腸不適、脹氣、噁心感、輕微腹瀉、味覺異常。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
2. 上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：嚴重嘔吐、呼吸急促、肌肉酸痛、疲倦嗜睡。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向
醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
國軍高雄總醫院 藥劑科 藥物諮詢專線：07-7496730